


Navn: C-OQ45, George, R	Journal: MRN0101	Signalstatus/fargekode: NA
Dato for timen: 1/12/2014	Time nr.: 1	Siste skåring: 81
Terapeut: Clinician, Bob	Klinikk: Clinic A	Første skåring: 81
Diagnose: Unknown Diagnosis		Endring fra første skåring: No Reliable Change
Instrument: OQ®-45.2		Aktuelt belastningsnivå: Moderate

Siste status for kritiske punkter:	Subskalaer:	I dag:	Cutoff polikl.pas.:	Cutoff normalutv.:
8. Selvmordsrisiko - Jeg har hatt tanker om å gjøre slutt på livet. Sjelden	Symptomtrykk:	48	49	25
11. Rusmisbruk - Etter at jeg har drukket mye, trenger jeg å drikke neste dag også, for å kunne komme meg "på beina". Av og til	Interpersonlige relasjoner:	17	20	10
26. Rusmisbruk - Jeg blir irritert over mennesker som kritiserer mitt forbruk av alkohol (eller narkotika/piller). Av og til	Sosial rolle:	16	14	10
32. Rusmisbruk - Jeg har vanskeligheter på arbeid/skole/ i min nåværende situasjon p.g.a. alkohol eller narkotika/ piller. Av og til	Totalskår:	81	83	45
44. Utageringsrisiko på jobb/skole/dagliglivet - Jeg føler meg så sint på arbeidet/skolen/ i min nåværende situasjon, at jeg kan komme til å gjøre noe jeg vil angre på. Sjelden				

Normative Comparison Groups



Grafisk framstilling:

Inpatient - Akuttavdelingspasienter

MH Center - DPS-Poliklinikk-/dagavdelingspasienter

MBH - 1. linje psykiatritjeneste

EAP - BHT-Bedriftshelsetjeneste/studenthelsetjeneste

Community Sample - Normalutvalg - randomisert befolkningsutvalg

Feedbackmelding:

Scores in this range are typical of persons who enter outpatient psychotherapy. It can be anticipated that a reduction of the score by 14 points or more will occur within the first eight sessions of treatment. Most patients within this score range show a reliable benefit from treatment interventions. At the end of treatment that lasts about 18 sessions, the majority of clients with a score in this range will report distress that is within the normal range of functioning.

PÅMINNELSE: BRUKEREN ER FULLT UT ANSVARLIG FOR ALLE AVGJØRELSE SOM GJELDER PASIENTBEHANDLING. OQ@-A ER IKKE ET DIAGNOSTISK REDSKAP OG SKAL IKKE BENYTTES TIL ET SLIKT FORMÅL. DEN ER IKKE EN ERSTATNING FOR MEDISINSKE ELLER ANDRE PROFESJONELLE VURDERINGER. BRUKEN AV OQ@-A SKJER FULLT UT PÅ BRUKERENS RISIKO OG ANSVAR. (SE LISENSEN FOR DEN KOMPLETTE ORDLYDEN NÅR DET GJELDER RETTIGHETER, ANSVARFORHOLD OG KLAGEMULIGHETER.