

## Skala for medikamentinduserte ekstrapyramidale symptomer (DIEPSS)

Studie: \_\_\_\_\_  
Pasient: \_\_\_\_\_  
Undersøker: \_\_\_\_\_  
Dato:            Dag       Måned       År \_\_\_\_\_  
Tidsrom for vurderingen: \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_

Gradering  
 0 = Ingen symptomer, normale funn  
 1 = Minimale symptomer, usikre funn  
 2 = Lette  
 3 = Moderate  
 4 = Alvorlige

Les undersøkerens manual til DIEPSS nøye for detaljert forklaring på hva som kreves for de ulike graderingsnivåene.

Sett sirkel rundt alternativet som passer best.

<b>1. Gange</b>	0	1	2	3	4
Subbende gange, nedsatt ganghastighet. Vurder grad av reduksjon i hastighet og skrittlengde, medbevegelse i armene, lutende holdning og propulsjon.					
<b>2. Bradykinesi</b>	0	1	2	3	4
Treghet og lite bevegelse: forsinket start på bevegelser og/eller vanskeligheter med å sette i gang og/eller avslutte bevegelser. Vurder også grad av reduksjon i ansiktsmimikk (maskeansikt) og monoton, slørete tale.					
<b>3. Sialoré</b>	0	1	2	3	4
Økt spyttsekresjon.					
<b>4. Rigiditet</b>	0	1	2	3	4
Motstand mot fleksjon og ekstensjon i overarmene. Grader også tannhjul- og blyørsgiditet, voksaktig fleksibilitet og bevegelse i håndledd.					
<b>5. Tremor</b>	0	1	2	3	4
Repetitive, regelmessige (4-8 Hz) og rytmiske bevegelser observert oralt og perioralt (munnhule, kinn og lepper), i fingre, armer, bein og trunkus.					
<b>6. Akatisi</b>	0	1	2	3	4
Subjektiv følelse av indre rastløshet og stress relatert til dette; legger selv merke til manglende evne til å forbli sittende, rastløse ben, behov for å fikle med ting, konstant bevegelsestrang etc. Vurder også økning i motoriske fenomener (rugge frem og tilbake, skifte vekt fra fot til fot, trippe med beina på stedet, krysse beina gjentatte ganger, vandre omkring etc.).					
<b>7. Dystoni</b>	0	1	2	3	4
Økt muskeltonus som resulterer i symptomer som stivhet, vridende bevegelser og vedvarende unormale muskelstillinger observert i tunge, hals, armer, bein, trunkus etc. Vurder graden av fremskutt tunge, torticollis, retrocollis, trismus, okulogyr krise, Pisa-syndrom etc.					
<b>8. Dyskinesi</b>	0	1	2	3	4
Hyperkinetiske unormale bevegelser. Tilsynelatende meningsløse, uregelmessige og ufrivillige bevegelser som observeres i ansikt, munn, tunge, kjeve, armer, bein og/eller trunkus. Vurder choreatiske og atetotiske bevegelser, men ikke vurder tremor under dette punktet.					
<b>9. Samlet alvorlighetsgrad</b>	0	1	2	3	4
Samlet alvorlighetsgrad av ekstrapyramidale symptomer.					